Verzeichnis der Gattungen und Arten in F. v. Höhnel's Abhandlungen „Beiträge zur Mykologie", I-IX.

Von
J. Weese.

Bd. XI. 1934. Heft 3.

TITEL DER EINZELABHANDLUNGEN.

Zeitschrift f. Gärungsphysiologie, allg., landw. u. techn. Mykologie

VII. Über Schroeteriaster Elettariae Racib. p. 228-229

Bd. IV, 1914, p. 207-223

VIII. Über Plectophoma Umbelliferarum v. H., nebst Bemerkungen zu Diedickes Bearbeitung der Sphaeropsideen.

Bd. V, 1915, p. 191-215

IX. Über die Gattung Myxosporium Link.

— — o — —

Namenverzeichnis.

Die angegebenen Ziffern bedeuten die Nummer der Einzelabhandlung.

— — o — —

Namenverzeichnis zu F. v. Höhnel's Abhandlung: „Studien über Hyphomyceten“

Herausgegeben von J. Weese.

Centralblatt f. Bakteriologie,
2. Abt., 60. Bd., 1923, p. 1-26

TITEL DER EINZELABHANDLUNGEN:

— — o — —

Verzeichnis der Gattungen u. Arten.

Die Ziffern bezeichnen die Nummer der Einzelabhandlung.

—— o ——

Beiträge zur Uredineen-Flora von Mähren und Schlesien.

3. MITTEILUNG.

Von

J. Weese.

(1. Mitteilung siehe „Mitt. a. d. Botan. Inst. d. Techn. Hochschule in Wien“, IX. Bd., 1932, p. 33-42; 2. Mitteilung, ebenda, X. Bd., 1933, p. 13-24)

[Abkürzungen: M. = Mähren, Sch. = Schlesien, N. = leg. G. v. Nießl. Wenn bei einem Fund kein Sammlername angeführt ist, handelt es sich um einen solchen des Verfassers. F. = Frühling, S. = Sommer, H. = Herbst, W. = Winter]

———

Puccinia Persoon.
(Fortsetzung)

Puccinia variabilis Greville.
(Scottish Crypt. Flora, 1823, t. 75)
Aecidien auf Taraxacum officinale bei Bisterz und Schwarzkirchen (M.) (N.); Teleutosporenform bei Brünn und Adamsthal (M.) und Freiwaldau (Sch.) (N.) und bei Freudenthal, Altstadt, Vogelseifen (Sch.)

Puccinia major Dietel.
(Mitt. Thür. Bot. Ver., n. F., 1894, Heft, VI, p. 45-48)
Aecidien auf Crepis paludosa bei Iglau, leg. Reichhardt.

Puccinia praecox Bubák.
(Verhandl. naturf. Verein, Brünn, 36. Bd., 1894, (p. 4)
Auf Crepis biennis bei Girlitz (M.) (N.)

Puccinia tragopogonis (Persoon) Corda.
(Persoon, Synopsis fung., 1801, p. 211 sub Aecidium; Corda, Icon. fung., V., 1842, p. 50, t. II, fig. 11 sub Puccinia)
Auf Tragopogon orientale bei Lautschitz, Schleppowitz, Bisterz, Schebetein und Schwarzkirchen (M.) (F.) (N.)

Puccinia scorzonericola Tranzschel.
(Annales mycologicae, II, 1904, p. 159-161)
Auf Scorzonera humilis L. bei Bisterz, Schebetein, Lautschitz, Czeitsch, Schwarzkirchen (M.) (N.)

Die Angabe von Nießl bezüglich eines Aecidium auf Scorzonera humilis (siehe Verh. naturf. Ver., Brünn, 1865, p. 107) dürfte sich vermutlich auf Scorzonera austriaca beziehen, da für erstgenannte Art nur eine

Brachypuccinia bekannt ist. Das Aecidium würde zu Puccinia Scorzonerae (Schum.) Jacky (Jacky, Die Compositen-bewohnenden Puccinien, 1899, p. 54) gehören.

Puccinia suaveolens (Persoon) Rostrup.

(Persoon, Observat., II., 1799, p. 24 sub Uredo; Rostrup in Forh. skand. naturf. 11. möde i. Kjöbenh., 1874, p. 338-350 sub Puccinia)

Auf Cirsium arvense bei Brünn und bei Eisgrub (M.) (N.) und sehr gemein bei Freudenthal, Altstadt, Wiedergrün, Vogelseifen, Langenberg, Bennisch, Klein-Mohrau, Engelsberg, Würbenthal, Freiwaldau, Jägerndorf, Lindewiese, Jauernig (Sch.) etc., 1917-1935.

Puccinia cyani (Schleich.) Passerini.

(Schleicher, Plantae cryptog. Helvetiae, 1805, № 95 sub Uredo; Passerini in Rabenhorst, Fungi europ., № 1767 u. Hedwigia, XIII, 1874, p. 46 sub Puccinia)

Auf Centaurea cyanus bei Freudenthal und Altstadt (Sch.), August und September 1935.

Puccinia cirsii Lasch.

(Rabenhorst, Fungi europ., № 89 [1859])

Auf Cirsium oleraceum in Karlsbrunn, Ludwigsthal, Gabel, Krautenwalde und Ober-Waldeck bei Jauernig (Sch.), Wölfelsgrund beim Glatzer Schneeberg (Preuß. Sch.), auf Cirsium canum bei Freudenthal (Sch.), auf Cirsium palustre bei Karlsbrunn (Sch.) (H.)

Puccinia Cirsii lanceolati Schröter.

(Pilze Schlesiens, 1889, p. 317)

Auf Cirsium lanceolatum bei Brünn und Eisgrub (M.) (H.) (N.) und bei Freudenthal (Sch.)

Puccinia carduorum Jacky.

(Zeitschr. f. Pflanzenkrankh., IX, 1899, p. [27] u. [58])

Auf Carduus acanthoides bei Brünn und Eisgrub (M.) (H.) (N.), auf Carduus crispus bei Freudenthal, auf Carduus personata bei Karlsbrunn, Ludwigsthal, Gabel, Thomasdorf und verschiedenen Stellen des Altvatergebirges.

Puccinia bardanae Corda.

(Icon. fung., IV, 1840, p. 17)

Auf den Blättern von Arctium lappa und Arctium minus in Mähren und Schlesien gemein. In Weese, Eumycet. sel. exs., № 640 aus Jauernig (Sch.) ausgegeben.

Puccinia Jaceae Otth.

(Mitt. naturf. Gesellschaft, Bern, 1865, [veröffentlicht 1866], p. 173)

Auf Blättern von Centaurea phrygia an Wegrändern bei Schlesisch-Kotzendorf und am Köhlerberg bei Freudenthal (Sch.), August u. Sept. 1930-35. (Ausgegeben in Weese, Eumycetes sel. exs., № 441). Auf Centaurea Jacea bei Freudenthal (Sch.).

Über die Zugehörigkeit von Puccinia Compositorum Schlecht. auf Stengeln und Blättern von Centaurea Jacea, die Nießl (Vorarb. zu einer Kryptogamenflora von Mähren u. Österr.-Schlesien, II, Verh. naturf. Ver., Brünn, 1865, p. 55 [112]) für Eisgrub (M.) angibt, kann nur die Nachuntersuchung von Herbarexemplaren Sicherheit bringen.

Puccinia montivaga Bubák.

(Die Pilze Böhmens, I. Teil, Rostpilze, Prag, 1908,

p. 134)

Auf Blättern und Stengeln von Hypochoeris uniflora bei der Schäferei im Altvatergebirge (Sch.), August 1916.

Bubák (l. c.) gibt den Pilz auch für den Glatzer Schneeberg für dieselbe Nährpflanze (leg. Schroeter) an.

Puccinia Cichorii (DC.) Bellynck.

(Flore franç., VI, 1815, p. 74 sub Uredo Cichorii De Candolle; Kickx, Flore crypt. des Flandres, II, 1867, p. 65 sub Puccinia Cichorii Bellynck)

Auf Cichorium intybus bei Niemtschitz (M.) (N.).

Puccinia hieracii (Schum.) Martius.

(Enum. plant. Saell., II, 1803, p. 232 sub Uredo hieracii Schumacher; Martius, Flor. Mosqu., 1817, p. 226 sub Puccinia)

Auf Blättern von Hieracium murorum, Hieracium vulgatum und Hieracium pilosella bei Brünn und bei Chrostau (M.) (N.) (H.), auf Hieracium alpinum am Glatzer Schneeberg, (leg. Schroeter), auf Hieracium murorum bei Ludwigsthal und bei Karlsbrunn (Sch.)

Der von Schröter (Pilze Schlesiens, I, 1889, p. 394) als Puccinia Hieracii (Schum.) angegebene Pilz auf Picris hieracioides (Liegnitz, Breslau [Pr. Sch.]) ist zu Puccinia Picridis Haszlinsky (Brand- u. Rostpilze Ungarns, 1877) zu stellen. Die Schroeter'schen Pilze auf Leontodon autumnalis (Görlitz, Breslau, Liegnitz etc.) u. Leontodon hispidus (Leobschütz) (Pr. Sch.) etc. würden zu Puccinia Leontodontis Jacky gehören. Die auf Hypochoeris glabra (Liegnitz) und Hypochoeris radicata (Breslau, Liegnitz, Leobschütz etc.) wären zu

Puccinia Hypochoeridis Oudemans zu rechnen.

Puccinia tanaceti De Candolle.

(Flore franç., II, 1805, p. 222)

Auf Chrysanthemum (Tanacetum) vulgare am Schwarzbach beim Winterbrunnplatz in Freudenthal (Sch.), Sept. 1933 (Weese, Eumyc. sel. exs., № 617) und bei Altstadt, Spillendorf, Messendorf und Kotzendorf bei Freudenthal (Sch.), April und Herbst 1935.

Der Pilz wird auch von Reichhardt (Verhandl. d. zool. bot. Ges., Wien, V., 1855, p. 489) für Iglau angegeben.

— — o — —

Inhaltsverzeichnis
des
XI. Bandes (1934)
(Heft 1-3)

— — o — —

Druck Techn. Hochschule Wien.